



Microdacyn₆₀[®] • Roztwór do płukania i dezynfekcji ran - wrastające paznokcie

Producent: Kikgel

Czas wysyłki: Dostawa 1-2 dni

Cena

32,70 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Wybierz pojemność: Pojemność 100 ml Pojemność 250 ml

Opis produktu

Microdacyn₆₀[®] • Roztwór do płukania i dezynfekcji ran - wrastające paznokcie

Microdacyn jest wodnym roztworem oksydantów (super-oxidized solution) o działaniu antybakteryjnym. Służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych, takich jak owrzodzenia goleni, odleżyny, rany w przebiegu zespołu stopy cukrzycowej. Microdacyn wspomaga oczyszczanie autolityczne rany z martwicy oraz stwarza odpowiednie środowisko gojenia.

Środek służy do odkażania i płukania ran ostrych oraz przewlekłych takich jak:

- Owrzodzenia
- Odleżyny
- Rany w przebiegu stopy cukrzycowej
- Rany oparzeniowe
- Rany pooperacyjne
- Owrzodzenia nowotworowe

W podologii Microdacyn wykorzystujemy do dezynfekcji i przemywania ran:

- przy wrastających paznokciach przyspiesza proces gojenia
- ran powstałych po obtarciach
- ran powstałych po urazach paznokci dłoni i stóp
- ran powstałych na stopach i dłoniach po skaleczeniach

Roztwór do przemywania ran Microdacyn wykazuje doskonałe właściwości przeciwdrobnoustrojowe. Działanie Microdacyn zostało udowodnione w warunkach klinicznych w wielu kontrolowanych i randomizowanych badaniach – u 90% pacjentów doszło tam do wyraźnego wzrostu poziomu granulacji i poprawy otaczającej skóry*. Badania potwierdziły także, iż Microdacyn stanowi efektywne rozwiązanie redukujące biofilm bakteryjny (*Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*), a przy regularnym stosowaniu zapobiega ponownemu namnażaniu się mikroorganizmów i niweluje nieprzyjemne zapachy z ran.

Wysoka skuteczność antybakteryjna połączona jest z bezpieczeństwem stosowania. Microdacyn to jeden z najbardziej bezpiecznych produktów do płukania ran na rynku.

Aplikacja roztworu:

- Obficie nasączyć kompres gazowy roztworem Microdacyn i położyć bezpośrednio na ranę.
- Zabieg powtarzać 2 razy dziennie przez 15 min. oraz podczas każdej zmiany opatrunku.
- Microdacyn może być rutynowo stosowany zamiast soli fizjologicznej do przemywania ran pourazowych, ran oparzeniowych czy silnie zanieczyszczonych.
- Nasączenie przyschniętego opatrunku preparatem Microdacyn ułatwia jego usunięcie.
- Nie jest konieczne dodatkowe przemywanie rany przed zastosowaniem preparatu.
- Nie jest konieczne wypłukiwanie preparatu z rany.
- Microdacyn można stosować także bezpośrednio do płukania jamy ustnej, np. u pacjentów z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej w trakcie chemioterapii.

PODOLOG POLECA !